





















































































Navodila za jemanje zdravil za zdravljenje okužbe z bakterijo *Helicobacter pylori*

1. teden	1. dan		2. dan		3. dan		4. dan		5. dan		6. dan		7. dan	
	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer
Emozul® 40 mg 2-krat na dan po 1 kapsulo														
Fromilid® 500 mg 2-krat na dan po 1 tableto														
Hiconcil® 1000 mg 2-krat na dan po 1 tableto														

2. teden	8. dan		9. dan		10. dan		11. dan		12. dan		13. dan		14. dan	
	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer	zjutraj	zvečer
Emozul® 40 mg 2-krat na dan po 1 kapsulo														
Fromilid® 500 mg 2-krat na dan po 1 tableto														
Hiconcil® 1000 mg 2-krat na dan po 1 tableto														

Datum kontrolnega pregleda _____

Spoštovani!

Številne klinične raziskave so potrdile, da ima bakterija *Helicobacter pylori* odločilno vlogo v razvoju ulkusne bolezni, dispepsije in raka na želodcu.

Ulkusna bolezen je kronična bolezen, ki se ponavlja iz leta v leto in je lahko vzrok za različne, tudi hude zaplete. Če jo hočemo pozdraviti in tako preprečiti ponovne razjede, moramo odstraniti bakterijo *Helicobacter pylori*, zato vam je zdravnik predpisal kombinacijo zdravil. Zelo pomembno je, da jih **redno jemljete 14 dni**, saj se zaradi nerednega jemanja učinkovitost zdravljenja zmanjša.

Na drugi strani je preglednica, ki vam bo v pomoč pri pravilnem jemanju zdravil. Vsak dan lahko označite, da ste zdravilo vzeli.